

| IRBAB | | | | | | CHAMP D'OBSERVATION BETTERAVE | | | | | |
|---|--|---------------|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|------|--|--|--|
| FICHE D'OBSERVATION I (semis - stade 4-6 feuilles) | | | | | | | | | | | |
| A COMPLETER AU CHAMP POUR L'INTRODUCTION DES DONNEES ON-LINE | | | | | | | | | | | |
| Cette fiche peut être envoyée par fax (016/82.04.68) à l'IRBAB, si l'encodage par Internet n'est pas réalisable | | | | | | | | | | | |
| Champ - code BTW | | | | Observateur | | | | Date | | | |
| Village | | | | | | | | | | | |
| A compléter dès la 1ère observation | | Date de semis | Interligne (cm) | Espacement dans ligne | Variété | Traitement insecticide (+ dose) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 4. Développement de la culture | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Aspect général et problèmes divers | | | | | | | | | | | |
| Evaluation 0-5 | | | | | | | | | | | |
| Commentaires / Problèmes éventuels | | | | | | | | | | | |
| 4.2. Stade (nombre de feuilles, du semis à la fermeture des lignes) | | | | | | | | | | | |
| minimal | | général | | maximal | | si > 10 fe.: % fermeture lignes | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Commentaires / Problèmes éventuels | | | | | | | | | | | |
| 4.3. Levée: comptage (du semis à la levée finale) | | | | | | | | | | | |
| Nombre par ligne de 10 m (recommandé: 8 valeurs) | | | | | | nombre de doublons: <input type="text"/> | | | | | |
| L 1 | | | | L 5 | | | | | | | |
| L 2 | | | | L 6 | | | | | | | |
| L 3 | | | | L 7 | | | | | | | |
| L 4 | | | | L 8 | | | | | | | |
| Commentaires / Problèmes éventuels | | | | | | | | | | | |
| 4.4. Ravageurs en début de végétation | | | | | | | | | | | |
| 4.4.1. Insectes | | | | Nombre de plantules observées (recommandé: 40): <input type="text"/> | | | | | | | |
| Porter des gants! | | | | AVEC traitement insecticide | | SANS traitement insecticide | | | | | |
| | | | | dégât 0 - 5 | individus total | dégât 0 - 5 | individus total | | | | |
| Atomaires (souterrains) | | | | | | | | | | | |
| Taupins | | | | | | | | | | | |
| Tipules | | | | | | | | | | | |
| Blaniules & Scutigérelles | | | | | | | | | | | |
| Commentaires / Problèmes éventuels | | | | | | | | | | | |
| 4.4.2. à 4.4.4. REMARQUES (1 ligne par phénomène / parasite) | | | | | | | | | | | |
| dégâts de gel, mulots, gibier, limaces, collemboles, thrips, fonte de semis, ... autres (mentionnez) | | | | | | | | | | | |
| 1: | | | | | | | | | | | |
| 2: | | | | | | | | | | | |
| 3: | | | | | | | | | | | |
| 4: | | | | | | | | | | | |
| 5: | | | | | | | | | | | |