

Ravageurs en début de végétation

1

- Atomaire souterrain, taupin, tipules, collembole, blaniules, scutigérelles,...
- Sur 40 plantules choisies aléatoirement et isolées.
Si nombre pas respecté, le spécifier sur la fiche d'observations.
- Comptage des ravageurs sur plantule et motte de terre
 - déterrer plantule délicatement avec motte de terre
(avec petite pelle ou couteau, diamètre motte ± 5 cm et profondeur de ± 10 à 12 cm).
- Évaluation des piqûres sur les racines ou hypocotyle par Echelle 5-5
- *Porter des gants de protection souples lors de la manipulation des mottes de terre (=> éviter contact avec insecticides, herbicides, granulés d'azote,...).*
- Période : semis jusqu'à 4 feuilles.

Dégâts de gel à la levée

2

- A communiquer aussitôt par GSM ou par mail



Atomaires souterrains

3

1,5 - 3.5
mm




Taupins, Larves de Tipules

4



Collemboles

5




Blaniules

6




Scutigérelles

7



Thrips

8



Chicorée : larve de « mouche des semis » *Delia platura*

9



Divers : mulots

10



Divers : gibier, oiseaux

11



Divers : gibier, lièvres

12



Divers : limaces

13



Divers : Pythium, Aphanomyces

14

étranglement



Divers : larves de bibions

15



Divers : Nématodes autres

16



Divers : Grêle

17



Divers : herbicides

18



Divers : faiblesse germination

19



Divers : coloration génétique

20



Divers : coloration génétique

21



Divers : anomalie génétique

22



Divers : épandage « engrais »

23

