

IRBAB-KBIVB

LIJST VAN DE BESCHIKBARE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN DE BIETENTEELT

Meer info in publicaties van het KBIVB en op www.fytoweb.fgov.be

Dit zijn niet noodzakelijk de aanbevelingen van het KBIVB-IRBAB, het KBIVB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan de teelt of voor een gebrek aan werking.

INSECTICIDEN					Update 14/03/2018		Veiligheids- termijn
Werkzame stof(fen)	Gehalte (g of %)	Formulering	HANDELSNAAM	Erkennings nummer	Gevaren symbolen	Opmerking	
beta-cyfluthrin	25	EC	BULLDOCK 25 EC	9835P/B	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09	Bufferzone 5m met klassieke techniek, gevaarlijk voor bijen, niet op bloeiende planten toepassen	28 d
clothianidin	600	FS	PONCHO 600 FS	9472P/B	GHS07 GHS09	Erkenning enkel voor bietenzaden -secundaire werking tegen miljoenpoten en wortelduizenpoten	
clothianidin+beta-cyfluthrin	400 + 53,3	FS	PONCHO BETA	9474P/B	GHS07 GHS09	Erkenning enkel voor bietenzaden	
clothianidin+ beta-cyfluthrin+ imidacloprid	100 + 80 + 100	FS	JANUS FORTE	10669P/B	GHS07 GHS09	Erkenning enkel voor bietenzaden. Om de vogels en de wilde zoogdieren te beschermen moeten de behandelde zaaizaden volledig in de bodem worden ondergewerkt. Zorg ervoor dat de behandelde zaaizaden ook op de wendakker zijn ondergewerkt. Om de vogels en de wilde zoogdieren te beschermen moet u gemorste behandelde zaaizaden verwijderen.	
lambda-cyhalothrin	100	CS	AKAPULKO 100 CS	1237P/P	GHS07 GHS09	Max. 3 toep./ teelt + bufferzone 20m met klassieke techniek, gevaarlijk voor bijen, gebruik dit product niet op het moment dat bijen actief naar voedsel zoeken	7 d
			KARATE ZEON	9231P/B en 1067P/P			
			KARIS 100 CS	10028P/B en 1133P/P			
			KORADO 100 CS	10377P/B			
			LAMBADA	1174P/P	GHS07 GHS08 GHS09	Max. 2 toep./ teelt + bufferzone 10 m met klassieke techniek, gevaarlijk voor bijen, gebruik dit product niet op het moment dat bijen actief naar voedsel zoeken	
			Life Scientific Lambda-cyhalothrin	9987P/B			
			NINJA	9571P/B	GHS07 GHS09	Max. 3 toep./ teelt + bufferzone 20m met klassieke techniek, gevaarlijk voor bijen, gebruik dit product niet op het moment dat bijen actief naar voedsel zoeken	
			SPARVIERO	10179P/B			
	50	EC	RAVANE 50	9647P/B	GHS05 GHS06 GHS08 GHS09	Max. 3 toep./ 12 maanden + bufferzone 20 m met klassieke techniek, gevaarlijk voor bijen, gebruik dit product niet op het moment dat bijen actief naar voedsel zoeken	7 d
			LAMBDA 50 EC	9749P/B			
gamma-cyhalothrin	60	CS	NEXIDE	10110P/B	GHS07 GHS08 GHS09	Max. 2 toep./ teelt + bufferzone 20m met klassieke techniek, gevaarlijk voor bijen, gebruik dit product niet op het moment dat bijen actief naar voedsel zoeken. Gebruik het niet op bloeiende planten, of in de buurt van in bloei staand onkruid.	/
deltamethrin	25	EC	SPLENDID	9627/B	GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09	Max. 3 toep./ 12 maand + bufferzone 10m met klassieke techniek, gevaarlijk voor bijen, gebruik dit product niet op het moment dat bijen actief naar voedsel zoeken	30 d
			DECIS EC 2.5	7172P/B			
			WOPRO-DELTAMETHRIN 2,5 EC	1179P/P			
			MEZENE	10367P/B		Max. 3 toepassingen/12 maanden + bufferzone van 5 m met klassieke techniek, gevaarlijk voor bijen, gebruik dit product niet op het ogenblik dat de bijen actief naar voedsel zoeken	30 d
			DELTAPHAR	10354P/B			
			SPLENDOUR	10466P/B			
			PATRIOT	9207P/B			
	15	EW	DECIS 15EW	10646P/B	GHS02 GSH09	Max. 1 toepassing/teelt + bufferzone van 5 m met klassieke techniek. Gevaarlijk voor bijen. Gebruik dit product niet op het ogenblik dat de bijen actief naar voedsel zoeken. Het product moet dus toegepast worden vroeg in de morgen of laat in de avond.	30 d
			PATRIOT PROTECH	10717P/B			
SPLIT			10718P/B				
dimethoaat	400	EC	DANADIM PROGRESS	8720P/B	GHS02 GHS07 GHS09	Max. 1 toepassing per teelt, gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of in de buurt van in bloei staand onkruid. Minimale bufferzone van 1 m met 90% driftreducerende techniek	28 d
			DIMISTAR PROGRESS	9528P/B			
			DIMISTAR PROGRESS 400 EC	8165P/B			
			PERFEKTHION 400 EC	9553P/B			
			PERFEKTHION TOP	10649P/B	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09		
			ROGOR 40	6180P/B			

INSECTICIDEN					Update 14/03/2018		
Werkzame stof(fen)	Gehalte (g of %)	Formulering	HANDELSNAAM	Erkenningsnummer	Gevarensymbolen	Opmerking	Veiligheids-termijn
imidacloprid	70	WS	GAUCHO 70 WS	8330P/B	GHS07 GHS09	Erkenning enkel voor bietenzaden, zeer giftig voor vogels, nevenwerking tegen emelten (Tipula spp.) en collombolen	
	600	FS	SOMBRERO	9757P/B	GHS07 GHS09	Erkenning enkel voor bietenzaden- product heeft nevenwerking tegen collombolen en emelten	
			NUPRID 600 FS	10477P/B	GHS07 GHS09	Erkenning enkel voor bietenzaden- Om de vogels en de wilde zoogdieren te beschermen moeten de behandelde zaaizaden volledig in de bodem worden ondergewerkt. Zorg ervoor dat de behandelde zaaizaden ook op de wendakker zijn ondergewerkt. Om de vogels en de wilde zoogdieren te beschermen moet u gemorste behandelde zaaizaden verwijderen. Gevaarlijk voor bijen en hommels. Om bijen en andere bestuivende insecten te beschermen, mag u geen teelt opstarten die bezocht kan worden door bijen of hommels als alternatief gewas in het geval van vroege vernietiging van het behandelde gewas. Om de bodemorganismen te beschermen mag u deze zaden of andere zaden behandeld met imidacloprid niet vaker dan één keer om de 12 maanden zaaien. Product heeft nevenwerking tegen collombolen en emelten.	
imidacloprid + clothianidine	375 + 150	FS	COFENO	10647P/B	GHS07 GHS09	Erkenning enkel voor bietenzaden - Om de vogels en de wilde zoogdieren te beschermen moeten de behandelde zaaizaden volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat de behandelde zaaizaden ook op de wendakker zijn ondergewerkt. Om de vogels en de wilde zoogdieren te beschermen moet u gemorste behandelde zaaizaden verwijderen.	
			PONCHO EXPERT	10635P/B			
imidacloprid + tefluthrin	400 + 17,8	FS	IMPRIMO	9363P/B	GHS07 GHS09	Erkenning enkel voor bietenzaden - product heeft nevenwerking tegen collombolen en emelten	
pirimicarb	50	WG	PIRIMOR	6640P/B en 1031P/P	GHS06 GHS08 GHS09	Gevaarlijk voor bijen, gebruik dit product niet op het moment dat bijen actief naar voedsel zoeken. Het product heeft geen onaanvaardbare effecten op de natuurlijke vijanden van bladluizen en andere nuttige arthropoden, met uitzondering van zweefvliegen. Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.	7 d
pirimicarb + lambda cyhalothrin	100 + 5	EC	OKAPI	7978P/B	GHS07 GHS08 GHS09	Max. 1 toep./ teelt + bufferzone 10 m met klassieke techniek, gevaarlijk voor bijen, gebruik dit product niet op het moment dat bijen actief naar voedsel zoeken - nevenwerking tegen bietenkever	7 d
tefluthrin	200	CS	FORCE	7744P/B	GHS07 GHS08 GHS09	Erkenning enkel voor bietenzaden	
thiamethoxam	70	WS	CRUISER	9335P/B	GHS02 GHS09	Erkenning enkel voor bietenzaden, secundaire werking tegen emelten (Tipula spp)	
	600	FS	CRUISER 600 FS	9763P/B	GHS09	Erkenning enkel voor bietenzaden, nevenwerking tegen emelten (langpootmuggen)	
zeta-cypermethrin	100	EW	FURY 100EW	8476P/B	GHS07 GHS09	Max. 1 toep./ 12 maanden + bufferzone 20 m met klassieke techniek, gevaarlijk voor bijen, gebruik dit product niet op het moment dat bijen actief naar voedsel zoeken	14 d
			MINUET	9636P/B	GHS07 GHS09		
 GHS02: ontvlambaar  GHS05: corrosief (bijtend)  GHS06: acuut toxisch, giftig  GHS07: schadelijk voor de gezondheid  GHS08: schadelijk voor de gezondheid op lange termijn  GHS09: milieugevaarlijk							