

## LISTE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES UTILISES EN CULTURE BETTERAVIERE

Plus d'infos dans les publications de l'IRBAB et sur [www.phytoweb.fgov.be](http://www.phytoweb.fgov.be)

Ceux-ci ne sont pas nécessairement les recommandations de la KBIVB-IRBAB, l'IRBAB ne peut être tenu responsable des dommages à la culture ou à un manque d'action

ADDITIFS					Update	18/03/2016		
Substance(s) active(s)	Teneur (g/l or %)	Formulation	NOM COMMERCIAL	Numéro d'agréation	Symboles	Catégorie de danger	Remarques	Délai avant récolte
huile de colza estérifiée	733	EC	MERO	9871/B	Xi, N	irritant	Délai avant récolte en fonction du produit auquel l'adjivant est ajouté, zone tampon minimale de 1 m avec technique classique.	
	812	EC	ACTIROB B	8665/B	/	/	Idem ci-dessus	
			NATOL	9298/B	/	/	Idem ci-dessus	
			VEGETOP	9294/B	/	/	Idem ci-dessus	
	842	EC	TIPO	9447/B	/	/	Idem ci-dessus	
	636	EW	GAON	9629/B	Xi, N	sensibilisant et dangereux pour l'environnement	Idem ci-dessus + zone tampon de 5 m avec technique classique	
			ZARADO	10242P/B	Xi, N	sensibilisant et dangereux pour l'environnement	Idem ci-dessus	
huile paraffinique	730	EC	BIO-TOP	7676/B	/	/	Délai avant récolte en fonction du produit auquel l'adjivant est ajouté.	
	800	EC	TOP OIL S	7637/B	/	/	Délai avant récolte en fonction du produit auquel l'adjivant est ajouté, zone tampon minimale de 1 m avec technique classique.	
			WEED-OIL	9403/B	/	/	Idem ci-dessus	
	850	EC	PROTEX OIL 850g/l	7887/B	/	/	Zone tampon minimale de 1 m avec technique classique.	
			VIROIL	6555/B	/	/	Délai avant récolte en fonction du produit auquel l'adjivant est ajouté, zone tampon minimale de 1 m avec technique classique.	
ester de phosphate d'alcools gras polyoxyalkyles + esters méthyliques d'acides gras + acide oleique	209+ 349+ 46	EC	DASH	10282/B	Xn	nocif et irritant	Idem ci-dessus + zone de tampon de 5 m avec technique classique	