

- Nématode à kyste de la betterave (*Heterodera schachtii*) : en juin, en été, ++++
- Nématode du collet (*Ditylenchus dipsaci*) : en été, à la récolte, +
- Nématodes à galles (*Meloidogyne* sp,) : au printemps, ©
- Nématodes libres (*Trichodorus* sp.) : au printemps ©

- ++++ : très fréquent
- + : occasionnel
- © : rare

Nématode à kyste de la betterave (*Heterodera schachtii*)

2

- En juin: petites boules blanchâtres visibles (à la loupe) sur les radicelles = femelles enkystées



Nématode à kyste de la betterave (*Heterodera schachtii*)

- En été : ronds de betteraves encore flétries le matin



Nématode du collet (*Ditylenchus dipsaci*)

- En fin de saison : (petits) ronds de betteraves attaquées au collet



Nématode du collet (*Ditylenchus dipsaci*)

- En fin de saison : (petits) ronds de betteraves attaquées au collet



Nématode du collet (*Ditylenchus dipsaci*)

- En fin de saison : (petits) ronds de betteraves attaquées au collet



Nématode à galles (*Meloidogyne* sp.)

- En mai - juin : ronds de betteraves chétives, avec racines noueuses



Nématodes libres (*Trichodorus* sp.)

- En mai - juin : ronds de betteraves chétives, avec racines horizontales

