

LISTE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES UTILISES EN CULTURE BETTERAVIERE

Plus d'infos dans les publications de l'IRBAB et sur www.phytoweb.fgov.be

Ceux-ci ne sont pas nécessairement les recommandations de la KBIVB-IRBAB, l'IRBAB ne peut être tenu responsable des dommages à la culture ou à un manque d'action

FONGICIDES							Update : Juin 2020	
Substance(s) active(s)	Formulation	Nom commercial	Numéro d'agréation	Dose (l/h ou kg/ha)	Nbr application max/an	ZT (m)	DAR (j)	Remarques
ciproconazole 160g/l + trifloxystrobine 375g/l	SC	AGORA	10470P/B	0,35	1	20	21	-
ciproconazole 80g/l + azoxystrobine 200g/l	SC	MIRADOR XTRA	9502P/B	1	2	1	35	Avec au moins 21 jours entre deux traitements
difenconazole 250g/l	EC	DIFCOR 250 EC	9454P/B 1077P/P	0,5	3	1	21	Avec au moins 14 jours entre 2 traitements
		DIFENOBEL	1091P/P	0,5	3	1	21	
		DIFENOCONABEL	1154P/P	0,5	3	1	21	
		DIFFERENCE	1078P/P	0,5	3	1	21	
		EUROCONAZOL	1082P/P	0,5	3	1	21	
		GEYSER	8256P/B	0,5	3	1	21	
		INTER DIFENOCONAZOLE 250	988P/P	0,5	3	1	21	
		MAVITA 250 EC	10715P/B	0,5	3	1	21	
		PLOVER	970P/P	0,5	3	1	21	
		SQUARE 250 EC	10785P/B	0,5	3	1	21	
		TAPIER	9477P/B	0,5	3	1	21	
		TAPIER 250 EC	10496P/B	0,5	3	10	21	Avec au moins 14 jours entre 2 traitements. Pour protéger les eaux souterraines, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles si des mesures de lutte contre l'érosion des sols soient mises en oeuvre.
difeconazole 125g/l + azoxystrobine 125g/l	SC	BICANTA	10894P/B	1	2	5	35	avec au moins 21 jours entre 2 traitements
		QUADRIS GOLD	10900P/B	1	2	5	35	
difenconazole 100g/l + fenpropidine 375g/l	EC	SPYRALE	8860P/B	1	1	20	28	avec technique réduisant la dérive de 90%
epoxyconazole 125g/l	SC	ATTA-POXX 125	1197P/P	0,75	2	10	28	avec au moins 21 jours entre 2 traitements. Afin de protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Le produit peut être utilisé sur ces parcelles si des mesures de lutte contre l'érosion des sols soient mises en oeuvre.
		LUSAN	10696P/B	0,75	2	10	28	
		PROPOV	10737P/B	0,75	2	10	28	
		POKSIE 125	1097P/P	0,75	2	10	28	
		RUBRIC	9738P/B 1209P/P	0,75	2	10	28	
		TIFEX	10348P/B	0,75	2	10	28	
epoxyconazole 100g/l + azoxystrobine 100g/l	SC	MERCURY	10702P/B	1	2	20	28	Afin de protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Le produit peut être utilisé sur ces parcelles si des mesures de lutte contre l'érosion des sols soient mises en oeuvre.
epoxyconazole 84g/l+ fenpropimorphe 250g/l	SE	OPUS TEAM	8473P/B	0,7	2	20	28	Ne pas nourrir le bétail avec les feuilles de betteraves qui ont été traitées avec ce produit.
epoxyconazole 50g/l + pyraclostrobine 133g/l	SE	RETENGO PLUS	9290P/B	0,8-1	2	20	28	avec technique réduisant la dérive de 50%. Avec au moins 21 jours entre 2 traitements. Afin de protéger les organismes aquatiques, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Le produit peu être utilisé sur ces parcelles si des mesures de lutte contre l'érosion des sols soient mises en oeuvre. L'oïdium peut se montrer moins sensible ou résistant à la pyraclostrobine. L'efficacité de l'époxyconazole contre l'oïdium est secondaire et peut s'avérer insuffisante en cas de forte infestation
!!! Retrait des autorisations des produits à base d'epoxyconazole : L'utilisation des ces produits est autorisée jusqu'au 31/10/2020.								
fenpropimorphe 750 g/l	EC	CORBEL	7313P/B	0,75	1	1	45	en mélange avec 150 g/ha de carbendazime ou 300 g/ha de thiophanate-méthyl. Les femmes enceintes ou en âge de procréer ne peuvent être exposées à ce produit.
!!! Retrait des autorisations des produits à base de fenpropimorphe : L'utilisation des ces produits est autorisée jusqu'au 31/10/2021.								
tetraconazole 125g/l	ME	BELROSE	9897P/B	0,8	2	1	42	Avec au moins 20 jours entre 2 traitements
		EMINENT	9566P/B	0,8	2	1	42	
soufre 80%	WG	COSAVET	8775P/B	7,5	-	1	-	Traitement préventif contre l'oïdium
		BIOSOON 80	1252P/B	5	-	1	-	
		KUMULUS WG	9185P/B	7,5	-	1	-	
		HERMOVIT	6676P/B	5	-	1	-	
		POL-SULPHUR 80 WG	10672P/B	7,5	3	1	14	
		THIOVIT JET	5700P/B	7,5	-	1	-	
soufre 80%	WP	POL-SULPHUR 80 WP	10671P/B	7,5	3	1	14	Traitement préventif contre l'oïdium
soufre 825g/l	SC	MICROTHIOL SPECIAL LIQUID	10929P/B	7,3	2	5	3	Traitement préventif. Ne pas appliquer le produit à des températures supérieures à 30°C car il peut provoquer de la phytotoxicité.
Bacillus amyloliquefaciens strain QST 713 13,96g/l	SC	SERENADE ASO	10299P/B	4l/ha	4	1	-	Avec au moins 5 jours entre 2 traitements