

**CHAMP D'OBSERVATION BETTERAVE
FICHE D'OBSERVATION I - Semis -> 2-4 feuilles**

GENERALITE

Observateur:
Localité:
Date:

ASPECT GENERAL DE LA CULTURE

Stade de développement
Stade de développement minimal
Stade de développement maximal
Espacement dans la ligne (mesurer la distance entre la plante 1 et 11 (cm) et diviser par 10, remplir au stade 2 feuilles)

LEVEE

Nombre de plantes par 10 m
(remplir jusqu'au stade 2 feuilles inclus)

L1		L5	
L2		L6	
L3		L7	
L4		L8	

DEGATS

DEGATS: DEPERISSEMENT DE PLANTULES

Quelle est la cause des dégâts ?

	Oui	Non
Mulots		
Tipules		
Taupins		
Blaniules au scutigérelles		
Collemboles		
Atomaires souterrains		
Limaces		
Gibier		
Dégâts de gel		
Fonte de semis (Aphanomyces, Pythium, Rhizoctone)		
Herbicide		
Non identifié		

DEGATS INSECTES FOLIAIRES

INSECTES FOLIAIRES - DEGATS AERIENS

Nombre de plantes observées (4x10 plantes)

Combien de plantes présentent des dégâts aériens?

--

Quels sont les insectes souterrains PRESENTS ?

	Oui	Non
Altises		
Atomaires aériens		
Pégomyies		
Thrips		
Pucerons noirs		
Pucerons verts		
Non identifié		

PRESENCE DE PUCERONS

Nombre de plantes observées (4x10 plantes)

Nombre TOTAL de pucerons verts aptères (=non-ailés) sur la TOTALITE des plantes observées

--

Nombre TOTAL de pucerons verts ailés sur la TOTALITE des plantes observées

--

Nombre de plantes avec des colonies de pucerons noirs

--

TRAITEMENT INSECTICIDE FOLIAIRE

Date du traitement

--

Produit utilisé

--

Dose (g/ha ou l/ha)

--

Si mélange:

--

--

REMARQUES - OBSERVATIONS DIVERSES

La présence d'autres ravageurs et/ou dégâts?
Observez-vous des insectes utiles?
