

LISTE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES UTILISES EN CULTURE BETTERAVIERE

Plus d'infos dans les publications de l'IRBAB et sur www.phytoweb.fgov.be

Ceux-ci ne sont pas nécessairement les recommandations de la KBIVB-IRBAB, l'IRBAB ne peut être tenu responsable des dommages à la culture ou à un manque d'action

FONGICIDES

Update : Juin 2021

Substance(s) active(s)	Formulation	Nom commercial	Numéro d'agrément	Dose (l/h ou kg/ha)	Nbr application max/an	ZT (m)	DAR (j)	Remarques
cyproconazole 160g/l + trifloxystrobine 375g/l	SC	AGORA	10470P/B	0,35	1	20	21	-
cyproconazole 80g/l + azoxystrobine 200g/l	SC	MIRADOR XTRA	9502P/B	1	2	1	35	Avec au moins 21 jours entre deux traitements
!!! Retrait des autorisations des produits à base de cyproconazole : L'utilisation des ces produits est autorisée jusqu'au 31/11/2022.								
difenoconazole 250g/l	EC	DIFCOR 250 EC	9454P/B 1077P/P	0,5	3	1	21	Avec au moins 14 jours entre 2 traitements
		DIFENOCONABEL	1154P/P	0,5	3	1	21	
		DIFFERENCE	1078P/P	0,5	3	1	21	
		DIFURE SOLO	11050P/B	0,5	2	5	21	
		EUROCONAZOL	1082P/P	0,5	3	1	21	
		GEYSER	8256P/B	0,5	3	1	21	
		INTER DIFENOCONAZOLE 250	988P/P	0,5	3	1	21	
		MAVITA 250 EC	10715P/B	0,5	3	1	21	
		PLOVER	970P/P	0,5	3	1	21	
		PROFI DIFENO 250 EC	11135P/B	0,5	3	7	21	
		SQUARE 250 EC	10785P/B	0,5	3	1	21	
TAPIER	9477P/B	0,5	3	1	21	Avec au moins 14 jours entre 2 traitements. Pour protéger les eaux souterraines, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles si des mesures de lutte contre l'érosion des sols soient mises en oeuvre.		
TAPIER 250 EC	10496P/B	0,5	3	10	21			
difeconazole 125g/l + azoxystrobine 125g/l	SC	ANGLE	11138P/B	1	2	5	35	avec au moins 21 jours entre 2 traitements
		BICANTA	10894P/B	1	2	5	35	
		QUADRI GOLD	10900P/B	1	2	5	35	
difenoconazole 100g/l + fenpropidine 375g/l	EC	SPYRALE	8860P/B 1404P/P	1	1	20	28	avec technique réduisant la dérive de 90%
fenpropimorphe 750 g/l	EC	CORBEL	7313P/B	0,75	1	1	45	en mélange avec 150 g/ha de carbendazime ou 300 g/ha de thiophanate-méthyl. Les femmes enceintes ou en âge de procréer ne peuvent être exposées à ce produit.
!!! Retrait des autorisations des produits à base de fenpropimorphe : L'utilisation des ces produits est autorisée jusqu'au 31/10/2021.								
tetraconazole 125g/l	ME	BELROSE	9897P/B	0,8	2	1	42	Avec au moins 20 jours entre 2 traitements
		EMINENT	9566P/B	0,8	2	1	42	
		RIVIOR	9566P/B	0,8	2	1	42	
soufre 80%	WG	COSAVET	8775P/B	7,5	-	1	-	Traitement préventif contre l'oïdium
		BIOOON 80 WG	1252P/B	7,5	-	1	-	
		KUMULUS WG	9185P/B	7,5	-	1	-	
		HERMOVIT	6676P/B	5	-	1	-	
		POL-SULPHUR 80 WG	10672P/B	7,5	3	1	14	
		THIOVIT JET	5700P/B	7,5	-	1	-	
soufre 80%	WP	POL-SULPHUR 80 WP	10671P/B	7,5	3	1	14	Traitement préventif contre l'oïdium
soufre 825g/l	SC	MICROTHIOL SPECIAL LIQUID	10929P/B	7,3	2	5	3	Traitement préventif. Ne pas appliquer le produit à des températures supérieures à 30°C car il peut provoquer de la phytotoxicité.
soufre 800g/l	SC	FLOSUL	11022P/B	7,5	2	1	3	avec un intervalle d'au moins 15 jours.
Bacillus amyloliquefaciens strain QST 713 13,96g/l	SC	SERENADE ASO	10299P/B	4l/ha	4	1	-	Avec au moins 5 jours entre 2 traitements