

## LIJST VAN DE BESCHIKBARE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN DE INDUSTRIELE CICHOREITEELT

Meer info in publicaties van het KBIVB en op [www.fytoweb.fgov.be](http://www.fytoweb.fgov.be)

Dit zijn niet noodzakelijk de aanbevelingen van het KBIVB-IRBAB, het KBIVB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan de teelt of voor een gebrek aan werking.

FONGICIDEN							Update : Juni 2021	
Werkzame stof(fen)	Formulering	Handelsnaam	Erkenningsnummer	Dosis (l/h of kg/ha)	Max aantal toepassingen/jaar	Bufferzone (m)	Veiligheidsstermijn(j)	Opmerking
azoxystrobine 250g/l	SC	ORTIVA	9326P/B	1	1	5	21	-
		ZAKEO 250 EC	10716P/B	1	1	5	21	
difenoconazool 250g/l	EC	DIFCOR 250 EC	9454P/B 1077P/P	0,5	3	1	21	met min 14 dagen tussen 2 behandelingen
		DIFENOCONABEL	1154P/P	0,5	3	1	21	
		DIFFERENCE	1078P/P	0,5	3	1	21	
		EUROCONAZOL	1082P/P	0,5	3	1	21	
		GEYSER	8256P/B	0,5	3	1	21	
		INTER DIFENOCONAZOLE 250	988P/P	0,5	3	1	21	
		MAVITA 250 EC	10715P/B	0,5	3	1	21	
		PLOVER	970P/P	0,5	3	1	21	
		PROFI DIFENO 250 EC	11135P/B	0,5	3	7	21	
		SQUARE 250 EC	10785P/B	0,5	3	1	21	
		TAPIER	9477P/B	0,5	3	1	21	
		TAPIER 250 EC	10496P/B	0,5	3	10	21	Met een interval van 14 dagen tussen 2 behandelingen. Om het grondwater te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie toegepast werden is het gebruik wel toegestaan.
azoxystrobine 200g/l + difenoconazool 125g/l		ORTIVA TOP	9556P/B	1	1	1	30	-
tetraconazoOl 125g/l	ME	BELROSE	9897P/B	0,8	2	1	42	Met min 20 dagen tussen 2 behandelingen
		EMINENT	9566P/B	0,8	2	1	42	
		RIVIOR	9566P/B	0,8	2	1	42	