

LISTE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES UTILISES EN CULTURE DE CHICOREE A INULINE

Plus d'infos dans les publications de l'IRBAB et sur www.phytoweb.fgov.be

Ceux-ci ne sont pas nécessairement les recommandations de la KBIVB-IRBAB, l'IRBAB ne peut être tenu responsable des dommages à la culture ou à un manque d'action

FONGICIDES							Update : août 2021	
Substance(s) active(s)	Formulation	Nom commercial	Numéro d'agrément	Dose (l/h ou kg/ha)	Nbr application max/an	ZT (m)	DAR (j)	Remarques
azoxystrobine 250g/l	SC	ORTIVA	9326P/B	1	1	5	21	-
		ZAKEO 250 EC	10716P/B	1	1	5	21	
difenoconazole 250g/l	EC	DIFCOR 250 EC	9454P/B 1077P/P	0,5	3	1	30	Avec au moins 14 jours entre 2 traitements
		DIFENOCONABEL	1154P/P	0,5	3	1	30	
		DIFFERENCE	1078P/P	0,5	3	1	30	
		EUROCONAZOL	1082P/P	0,5	3	1	30	
		GEYSER	8256P/B	0,5	3	1	30	
		INTER DIFENOCONAZOLE 250	988P/P	0,5	3	1	30	
		MAVITA 250 EC	10715P/B	0,5	3	1	30	
		PLOVER	970P/P	0,5	3	1	30	
		PROFI DIFENO 250 EC	11135P/B	0,5	3	1	30	
		SQUARE 250 EC	10785P/B	0,5	3	1	30	
		TAPIER	9477P/B	0,5	3	1	30	
		TAPIER 250 EC	10496P/B	0,5	3	10	30	Avec au moins 14 jours entre 2 traitements. Pour protéger les eaux souterraines, le produit ne peut pas être utilisé sur les parcelles sensibles à l'érosion. Le produit peut néanmoins être utilisé sur ces parcelles si des mesures de lutte contre l'érosion des sols soient mises en oeuvre.
azoxystrobine 200g/l + difenoconazole 125g/l		ORTIVA TOP	9556P/B	1	1	1	30	-
tetraconazole 125g/l	ME	BELROSE	9897P/B	0,8	2	1	42	Avec au moins 20 jours entre 2 traitements
		EMINENT	9566P/B	0,8	2	1	42	
		RIVIOR	9566P/B	0,8	2	1	42	