IRBAB-KBIVB

LIJST VAN DE BESCHIKBARE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN DE BIETENTEELT

Deze lijst bevat informatie zoals overgenomen van Fytoweb (www.fytoweb.be)

Bufferstrook & driftreductie : indicaties volgens gegevens op etiket. Driftreductie van minimum 50% in Wallonie en 75% in Vlaanderen. (75%) betekent 'met klassieke techniek'.

Dit zijn niet noodzakelijk de aanbevelingen van het KBIVB-IRBAB, het KBIVB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan de teelt of voor een gebrek aan werking.

SELECTIEVE HERBICIDEN — **Update** — **20-03-25**

Actieve stof	Gehalte (g of %)	Formulering	HANDELSNAAM	Erkennings nummer	Buffer-strook (m) etiket	minimale drift-reducerende techniek	toepassings-stadium	max. aantal toepassingen	dosis	Gevaren symbolen	Opmerkingen	Veiligheids-termijn
Clethodim	240	EC	**CENTURION**	8246P/B	20	75%	na opkomst	**2**	afhankelijk van onkruid, stadium en aantal toepassingen	GHS07 GHS08 GHS09	In menging met veresterde koolzaadolie	**90 d**
			CLETHOFIN 240	31345 P/B	20	75%		**2**				
	120	EC	**INTER SELECT**	1367P/P	20	(75%)[a]		**2**			Lagere dosissen mogen niet gebruikt worden op zware bodems en/of wanneer er vermoedens bestaan omtrent optreden van resistentie.	
			OCTAVION 120 EC(*)	1265P/P	20	(75%)[a]		**2**				
			SELECT PRIM	9334P/B	20	(75%)[a]		**2**				
			SELECT PRO	29302 P/P	20	(75%)[a]		**2**				
			WOPRO PLUS	1347P/P	20	(75%)[a]		**2**				
	180	EC	**BRIXTON**	11210 P/B	1	90%	2 blad - sluiten van rijen	**1**	1,4 L/ha	GHS07 GHS08 GHS09	/	**80 d**
	240	EC	**PHYBELDIM 240 EC**	29683 P/P	1	75%	kiembladeren horizontaal ontvouwen - 9 of meer bladeren ontvouwen	**1**	0,75 L/ha	GHS07 GHS08	/	**56 d**
			VEXTADIM 240 EC	11064P/B	1	75%		**1**	0,75 L/ha	GHS07 GHS08	/	**56 d**
Clomazon	360	CS	**CENTIUM 360 CS**	8925P/B, 32961 P/P	1	(75%)[a]	Voor opkomst [(1)] 2 - 8 bladeren [(2)]	1[(1)] eventueel gefractioneerd[(2)]	Max. 72g clomazon a.s. per teelt.	/	/	**/**
			GAMIT 360 CS	11005P/B	1	(75%)[a]				GHS09		
			LIBECCIO	10732P/B	1	(75%)[a]						
			SIRTAKI	10918P/B 1389P/P	1	(75%)[a]						
Clopyralid	100	SL	**CLIOPHAR 100**	11040P/B	1	(75%)[a]	2 - 9 bladeren[(3)] 8-10 bladeren[(4)]	1-1,5 L/ha gefractioneerd[(3)] 1,2-1,5 L/ha[(4)]	Fracties van 0,5 L/ha[(3)] 1,2-1,5 L/ha[(4)] Max. 0,18 kg clopyralid/ 12 maanden	/	Nevenwerking tegen aardappelopslag. De resten van behandelde teelten kunnen nog clopyralid bevatten en een invloed hebben op volggewassen (in het geval van onderwerken) of op deze waarin de stoffen worden gebruikt (ingevoerd vanuit een behandeld veld als dusdanig gebruikt of na compostering en vervolgens in groetenteelt gebruikt...).	**42 d**
			MATRIGON	8200P/B	1	(75%)[a]				GHS09		
			VIVENDI 100 SL	9356P/B	1	(75%)[a]		1-1,5 L/ha gefractioneerd[(3)] 1,2-1,5 L/ha of 1,8 L/ha[(4)]	Fracties van 0,5 L/ha[(3)] 1,2-1,5 L/ha of 1,8 L/ha[(4)] Max. 0,18 kg clopyralid/12 maanden	/		
			CLOPYRELCO 100 SL	1321P/P	1	(75%)[a]				GHS09		

(*) Deze middelen zullen niet meer toegelaten zijn vanaf 01/07/2026. Het op de markt brengen door de toelatingshouder is toegelaten tot en met 31/12/2024. De verkoop en de stockage door derden is toegelaten tot en met 30/06/2025 en het gebruik tot en met 30/06/2026.

Cycloxydim	100	EC	**FOCUS PLUS**	8905P/B	1	(75%)[a]	2 bladeren - gewas bedekt 90% van de grondopp.	1	2 L/ha, kweekgras: 4-5L /ha	GHS07 GHS08 GHS09	Een dosis reductie is niet toegelaten op zware bodems of indien resistentie wordt verwacht.	**90 d**
Dimethenamide-p	720	EC	**ARUNDO**	10497P/B	20	(75%)[a]	4-8 bladeren	3	Max. 1 kg dimethenamid-P/ha/12 maanden Max. 1 L/ha/teelt	GHS07 GHS08 GHS09	/	**/**
			FRONTIER ELITE	9387P/B	20	(75%)[a]						
			GROMETA	10547P/B	20	(75%)[a]						
Dimethenamide-p + Quinmerac	333 + 167	SE	**TANARIS**	10928P/B	1	(75%)[a]	kiemlob - 8 bladeren	2	Max. 250 g quinmerac/ha/ 36 maanden	GHS07 GHS09	Interval van minstens 7 dagen tussen bespuitingen	**/**
Ethofumesaat	200	EC	**ETHOFOL 200 EC**	8237P/B	20	(75%)[a]	voor zaai/ voor opkomst kiemlob - 8 bladeren	1 toepassing, mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt	Max. 1 kg ethofumesaat/ha/ 36 maand	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09	Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificieerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan.	**/**
	500	SC	**OBLIX 500 SC**	8139P/B	20 [(5)] 1 [(6)]	(75%)[a]	voor zaai/ voor opkomst [(5)] kiemlob - 8 bladeren [(6)]			GHS09		
			BURAK 500 SC	10666P/B	20 [(5)] 1 [(6)]	(75%)[a]				GHS09		
			ETHOMAT 500	8090P/B	20	(75%)[a]	voor zaai/ voor opkomst kiemlob - 8 bladeren			GHS09		
			ETHOSIN FORTE SC	7110P/B	20	(75%)[a]				GHS09		
			KEMIRON SC	8595P/B	20	(75%)[a]				GHS09		
			CRISTOBAL 500	9783P/B	1	(75%)[a]	kiemlob - 8 bladeren			GHS07 GHS09	/	
			MURENA 500	9648P/B	1	(75%)[a]				GHS07 GHS09		
			ETHOSAT	33295 P/B	1	(75%)[a]			Max. 1 kg ethofumesaat/ha/ 36 maand Max. 2 l/ha/teelt Toegediend in fracties van maximum 0,66 l/ha	GHS09	Interval van minstens 5 dagen tussen de behandelingen	
			SPICULUS	30122 P/B	10	(75%)[a]					Interval van ten minste 7 dag(en) tussen twee toepassingen	

SELECTIEVE HERBICIDEN								update	20-03-25		
Actieve stof	**Gehalte (g of %)**	**Formulering**	**HANDELSNAAM**	**Erkennings nummer**	**Buffer-strook (m) etiket**	**minimale drift-reducerende techniek**	**toepassings-stadium**	**max. aantal toepassingen**	**dosis**	**Gevaren symbolen**	**Opmerkingen**	**Veiligheids-termijn**
Ethofumesaat+ Metamitron	150 + 350	SC	**TORERO**	9160P/B	20	(75%)[a]	voor opkomst - 8 bladeren	1 toepassing, mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt	Max. 2 L/ha/ toepassing Max. 6L/ha/12 maanden Max. 1 kg ethofumesaat/ha/ 36 maanden	GHS09	Interval van 7 dagen tussen twee toepassingen Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificieerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan.	/
			METAFOL SUPER	11082P/B	1	90%	voor opkomst [(7)] kiemlob - 8 bladeren [(8)]	1 [(7)] in fracties van 0,5 - 1 L/ha [(8)]	Max. 1 kg ethofumesaat/ha/ 36 maanden Max. 6 L/ha/12 maanden	GHS07 GHS09	Ten minste 7 dag(en) tussen twee toepassingen	/
Fluazifop-p-butyl	125	EC	**FUSILADE MAX**	9476P/B	1	(75%)[a]	tot het sluiten van de rijen	1 of 2	eventueel gefractioneerd volgens de onkruiden Max. 375 g fluazifop-p-butyl/ha/12 maanden	GHS08 GHS09	Lagere doses mogen niet gebruikt worden op zware bodems en/of wanneer er vermoedens bestaan optreden van resistentie.	**56 d**
			FREQUENT	10852P/B	1	(75%)[a]		1		GHS07 GHS08 GHS09	/	**56 d**
			PHANTOM	11202P/B	1	(75%)[a]		1 of 2		GHS08 GHS09	/	**56 d**
Foramsulfuron + Thiencarbazone-methyl Dit product mag alleen gebruikt worden op ALS-herbicidetolerante bietenvariëteiten	50 + 30	OD	**CONVISO ONE**	10827P/B	20	90%	kiemlob - 2-bladstadium	1 toepassing, vollevelds	Max. 1 L product/ha/teelt	GHS05 GHS07 GHS08 GHS09	Bladeren van bieten behandeld met dit product mogen niet aan het vee vervoederd worden wegens de aanwezigheid van residuen. - Na een teelt van suiker- of voederbieten behandeld met dit product, zijn in het kader van een normale teeltrotatie volgende teelten mogelijk: wintertarwe, wintergerst en raaigras. In het volgende kalenderjaar kunnen zomertarwe, zomergerst, erwten, bonen, maïs, suikerbiet, soja en koolzaad gezaaid worden. Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificieerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan. **Om resistentieopbouw te voorkomen moet het product gebruikt worden in menging met herbiciden met een ander werkingsmechanisme. De HRAC-code van Conviso® One is 2.**	/
						75%	kiemlob - 8-bladstadium	2 behandelingen aan 0,5 l/ha, waarbij maximum 60% van het perceeloppervlak behandeld wordt				
Glyfosaat Er bestaat een zekere incompatibiliteit, gepaard gaande met een verminderde doeltreffendheid, als herbiciden met een lange werking samen met middelen op basis van glyfosaat gebruikt worden. Daarom wordt aangeraden 1 week te wachten na toepassing van glyfosaat alvorens deze herbiciden toe te passen.	360	SL	**ROUNDUP ++**	9856P/B	1	90%	voor opkomst	1	Max. 3,6 kg glyfosaat/ha/12 maanden.	GHS07 GHS09	Niet meer toepassen op een gewas dat begint te punten (openbreken van grond)	/
			ROUNDUP PRO	10504P/B	1	90%						
			ROUNDUP STAR	10501P/B	1	90%						
			GARWIN	11013P/B	1	90%						
			VIKING	11014P/B	1	90%						
	450		**ROUNDUP ENERGY**	9343P/B	1	90%				GHS07 GHS09		
			ROUNDUP TOP	9344P/B	1	90%						
	500		**ROUNDUP DYNAMIC**	31854 P/B	1	(75%)[a]				GHS09		/
Lenacil	500	SC	**VENZAR 500 SC**	9696P/B	1	(75%)[a]	kiemlob- begin van het sluiten van de rijen	1 toepassing, mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt.	Max. 0,5 kg lenacil/ha/36 maanden	GHS08 GHS09	1 l/ha, eventueel gefractioneerd met een interval van 7-14 dagen Dit product niet gebruiken op zeer lichte zandgronden (<10% klei).	/
	800	WP	**VENZAR**	6188P/B	1	(75%)[a]						

Metamitron	700	SC	**ACTRON 700 SC**	10545P/B	1	90%	voor opkomst [9] kiemlob - 8 bladeren [10]	1 [9] gefractioneerd [10]	max. 3,5 kg metamitron/ha/12 maanden	GHS07 GHS09	/	/
			ALLITRON 700 SC	9090P/B	1	(75%)[a]				GHS07 GHS09		
			BEETIX SC	10679P/B	1	(75%)[a]				GHS07 GHS09	op humusrijke grondsoorten gaat de voorkeur uit naar uitsluitend na-opkomst toepassingen. met een interval van minimum 6 dagen, naargelang de te verwachten onkruidflora en het bodemtype, waarbij de hoogste dosis op zware gronden en/of gronden rijk aan organisch materiaal gebruikt zal worden.	
			BETTATRONEX SC	10680P/B	1	(75%)[a]				GHS07 GHS09		
			CORNER SC	9293P/B	1	90%				GHS07 GHS09	/	
			FINEX 700 SC	10539P/B	1	90%				GHS07 GHS09		
			GLOTRON 700 SC	10489P/B	1	90%				GHS07 GHS09		
			GOLTIX 700 SC	9114P/B	1	90%				GHS07 GHS09		
			KLAXXON	10490P/B	1	90%				GHS07 GHS09		
			KOMBO SC	9211P/B	1	90%				GHS07 GHS09		
			METAFOL 700 SC	9340P/B	1	(75%)[a]				GHS09		
			METALIQ 700SC	9570P/B	1	(75%)[a]				GHS09		
			METALIQ SC	11166P/B	1	(75%)[a]				GHS07 GHS09	op humusrijke grondsoorten gaat de voorkeur uit naar uitsluitend na-opkomst toepassingen. met een interval van minimum 6 dagen, naargelang de te verwachten onkruidflora en het bodemtype, waarbij de hoogste dosis op zware gronden en/of gronden rijk aan organisch materiaal gebruikt zal worden.	
			METATRON SC	9163P/B	1	90%				GHS07 GHS09	/	
			METOMAT	8563P/B	1	90%				GHS07 GHS09		
			MITRON SC	9091P/B	1	(75%)[a]				GHS07 GHS09		
			TARGET SC	8585P/B	1	(75%)[a]				GHS07 GHS09	op humusrijke grondsoorten gaat de voorkeur uit naar uitsluitend na-opkomst toepassingen. met een interval van minimum 6 dagen, naargelang de te verwachten onkruidflora en het bodemtype, waarbij de hoogste dosis op zware gronden en/of gronden rijk aan organisch materiaal gebruikt zal worden.	
			TORNADO	8432P/B	1	90%				GHS07 GHS09	/	
			PHYBELTRON 700	32702 P/P	1	(75%)[a]				GHS07 GHS09	op humusrijke grondsoorten gaat de voorkeur uit naar uitsluitend na-opkomst toepassingen. met een interval van minimum 6 dagen, naargelang de te verwachten onkruidflora en het bodemtype, waarbij de hoogste dosis op zware gronden en/of gronden rijk aan organisch materiaal gebruikt zal worden.	
			VEXTAMITRON 700 SC	10829P/B	1	75%				GHS07 GHS09	/	
	700	WG	**BEETIX 70 WG**	9247P/B	1	(75%)[a]				GHS07 GHS09	op humusrijke grondsoorten gaat de voorkeur uit naar uitsluitend na-opkomst toepassingen.	
			TARGET WG	9246P/B	1	(75%)[a]				GHS09	op humusrijke grondsoorten gaat de voorkeur uit naar uitsluitend na-opkomst toepassingen. met een interval van minimum 6 dagen, naargelang de te verwachten onkruidflora en het bodemtype, waarbij de hoogste dosis op zware gronden en/of gronden rijk aan organisch materiaal gebruikt zal worden.	

SELECTIEVE HERBICIDEN								update	20-03-25	
Actieve stof	**Gehalte (g of %)**	**Formulering**	**HANDELSNAAM**	**Erkennings nummer**	**Buffer-strook (m) etiket**	**minimale drift-reducerende techniek**	**toepassings-stadium**	**max. aantal toepassingen**	**dosis**	**Gevaren symbolen**	**Opmerkingen**	**Veiligheids-termijn**
Metamitron + Quinmerac	525 + 40	SC	**GOLTIX QUEEN**	10238P/B	1	(75%)[a]	voor opkomst [9] kiemlob, eerste blad zichtbaar - 9 of meer bladeren [10]	1 [9] gefractioneerd [10]	Max. 6 l product/teelt	GHS09	Max. 3,5 kg metamitron/ha/12 maanden Max. 250 g quinmerac/ha/36 maanden intervalle d''au moins 5-10 jour(s) entre deux applications	/
			GOLTIX TITAN	10408P/B	1	(75%)[a]						
	571 + 71	SC	**KEZURO**	10744P/B	1	75%	voor opkomst [9] kiemlob, eerste blad zichtbaar - 8 bladeren [10]	1 [9] gefractioneerd [10]	Max. 3,5 l product/teelt		Max. 3,5 kg metamitron/ha/12 maanden Max. 250 g quinmerac/ha/36 maanden met een interval van minimum 7 dagen tussen fracties	
Fenmedifam (PMP)	160	EC	**ASTRIX EC**	8140P/B	1	(75%)[a]	kiemlob- 8 bladeren	1 toepassing, mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt	Max. 960 g PMP/ha/12 maand	GHS05 GHS07 GHS08 GHS09	/	/
			DUKKA	10275P/B	1	(75%)[a]						
			ISOFAM	10276P/B	1	(75%)[a]						
		SC	**BETASANA SC**	9936P/B	5	(75%)[a]				GHS07 GHS09	Om de waterorganismen te beschermen mag het product niet gebruikt worden op erosiegevoelige percelen. Voor het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest geldt dit voor percelen geklasseerd als "sterk erosiegevoelig". Voor het Waals Gewest komt dit overeen met percelen geïdentificieerd met een R-code. Indien voorzorgsmaatregelen tegen erosie zoals vastgelegd in de gewestelijke wetgevingen toegepast werden is het gebruik wel toegestaan.	
			BEETUP 160 SC	10008P/B	5	(75%)[a]						
			CORZAL SC	10735P/B	5	(75%)[a]						
			DUKKA SC	10974P/B	5	(75%)[a]						
			ISOFAM SC	10976P/B	5	(75%)[a]						
		SE	**BETANAL SE**	9412P/B	1	(75%)[a]				GHS07 GHS09	/	
			DIANAL 160	9411P/B	1	(75%)[a]						
			KEMIFAM SE	8741P/B	1	(75%)[a]						
			MEDIFAM SE	9410P/B	1	(75%)[a]						
	320	SC	**KONTAKT 320 SC**	8076P/B	1	(75%)[a]				GHS05 GHS09	/	
			FENDIFAM 320	9641P/B	1	(75%)[a]						
PMP + Ethofumesaat	125 + 125	EC	**WIZARD**	35170P/B	10	75%	kiemlob - sluiten van de rijen	1 tot 5 toepassingen	Max. 960 g PMP/ha/12 maand Max. 1,0 kg ethofumesaat/ha/36 maanden	GHS05 GHS07 GHS09	Tijdens de manipulatie van het behandelde gewas een lange broek en chemisch bestendige handschoenen dragen. Interval van minimum 7 dagen tussen twee toepassingen.	/
	200 + 190	SC	**BETANAL TANDEM**	9021P/B	1	(75%)[a]	kiemlob - 8 bladeren	1 toepassing, mag gefractioneerd worden zolang de totale toegediende dosis de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt		GHS07 GHS09	Bij koud en overtrokken weer wordt aangeraden een erkende uitvloeier of emulgeerbare olie toe te voegen. - Er wordt aangeraden de spuitoplossing op het veld te bereiden en niet aan een concentratie lager dan 1% van het commercieel product te werken.	≠
	200 + 200	SC	**POWER TWIN**	9094P/B	1	(75%)[a]						
			BELVEDERE DUO	11077P/B	1	(75%)[a]						
			TRIADE TWIN	10962P/B	1	(75%)[a]						
Propaquizafop	100	EC	**AGIL**	8514P/B	1	(75%)[a]	/	eventueel gefractioneerd	Max. 1,5 l/ha/teelt afhankelijk van onkruid en stadium onkruid	GHS07 GHS08 GHS09	Een dosis reductie is niet toegelaten op zware bodems of indien vermoedens bestaan omtrent optreden resistentie + moet gebruikt worden in menging met een toevoegingsstof.	**60 d**
			KALAMOS	30143 P/B	1	(75%)[a]						
			READY	33324 P/B	1	(75%)[a]						
			ZETROLA	10727P/B	1	(75%)[a]						
Quinmerac	250	SC	**QUINDAPLUS**	35256 P/B	1	(75%)[a]	vooropkomst	1	Max. 0,25 kg quinmerac/ha/36 maanden	GHS07	Indien het product voor opkomst wordt toegepast, is een toepassing na opkomst niet meer toegelaten. Max 0,96 l/ha/teelt. Een interval van 5 tot 10 dagen dient aangehouden te worden tussen de behandelingen.	/
							kiemlob - eerste blad zichtbaar tot 8-bladstadium	1 à 3				
Quizalofop-P-ethyl	50	EC	**DARIUM**	10866P/B	1	90%	3 bladeren - sluiten van de rijen	1 (of 2)[11]	afhankelijk van onkruid en stadium onkruid	GHS05 GHS07 GHS08 GHS09	De aangegeven lagere dosissen mogen niet toegepast worden op zware bodems en/of wanneer er gevaar voor resistentie dreigt. [11] 1-2 toepassingen op weinig ontwikkelde onkruiden	**110 d**
			TREPACH	10851P/B								
			MACETA 50	11060P/B	1	75%	na opkomst	1 (of gefractioneerd)[12]			[12] tegen duist, hanepoot, kweekgras en wilde haver eventueel gefractioneerd.	**60 d**
			QUEEN 50 EC	10254P/B	1	75%	eerste bladeren zichtbaar - 3 bladeren	1			De aangegeven lagere dosissen mogen niet toegepast worden op zware bodems en/of wanneer er gevaar voor resistentie dreigt.	**60 d**
			QUIZELCO	(1225P/P)[14] 26580P/P	1	(75%)[a]	na opkomst	1 (of 2)[13]			De aangegeven lagere dosissen mogen niet toegepast worden op zware bodems en/of wanneer er gevaar voor resistentie dreigt. een paraffine-olie, versterkt met een al dan niet ionische uitvloeier (13) volgens onkruiden, zie fytoweb QUIZELCO: Dit middel zal niet meer toegelaten zijn vanaf 01/06/2024. Het op de markt brengen en het bewaren door de toelatingshouder zijn toegelaten tot 30/11/2022. Het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn toegelaten tot 31/05/2023 en het gebruik is toegelaten tot 31/05/2024.	**60 d**
			TARGA MEGAMAX	10256P/B								
			TARGA PRESTIGE	8612P/B								
Quizalofop-P-tefuryl	40	EC	**PANTERA**	10435P/B	1	90%	na opkomst	1	2,25 L/ha	GHS05 GHS08 GHS09	Niet mengen met een hulpstof. Een wachttijd van 120 dagen moet gerespecteerd worden voor het zaaien of het planten van volggewassen.	**60 d**

OPGELET: Herbiciden **waarvan de toelating in het jaar 2025 verloopt**

Clethodim	120	EC	**INTER SELECT (1)**	1367P/P	20	(75%)[a]	na-opkomst	2	2,25 L/ha	GHS05 GHS08 GHS09	Lagere dosissen mogen niet gebruikt worden op zware bodems en/of wanneer er vermoedens bestaan omtrent optreden van resistentie.	/
			SELECT PRO (1)	1343 P/P	20	(75%)[a]						
			WOPRO PLUS (2)	1347P/P	20	(75%)[a]						
Glyfosaat	480	SL	**ROUNDUP POWERMAX (3)**	10086P/B	1	(75%)[a]	voor-opkomst	1	Max 3,6 kg glyfosaat/ha/12 maanden	GHS09	Niet meer toepassen op een gewas dat begint te punten (openbreken van grond)	/
			ROUNDUP POWERTURBO (3)	10096P/B	1	(75%)[a]						
	720	SG	**ROUNDUP RECORD (3)**	10294P/B	1	(75%)[a]						
Lenacil	800	WP	**LENAZAR WP (4)**	9250P/B	5	(75%)[a]	kiemlob - sluiten van de rijen	1 toepassing, kan gefractioneerd worden zolang de totale hoeveelheid de maximale dosis voor deze teelt niet overschrijdt.	Max. 0,5 kg lenacil/ha/36 maanden	GHS08 GHS09	Niet toepassen op lichte gronden (zand of lichte zandleem)	/

(1) Dit middel zal niet meer toegelaten zijn vanaf 01/07/2025. Het op de markt brengen en het bewaren door de toelatingshouder zijn toegelaten tot 31/12/2023.
Het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn toegelaten tot 30/06/2024 en het gebruik is toegelaten tot **30/06/2025**.

(2) Dit middel zal niet meer toegelaten zijn vanaf 01/12/2025. Het op de markt brengen en het bewaren door de toelatingshouder zijn toegelaten tot 31/05/2024.
Het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn toegelaten tot 30/11/2024 en het gebruik is toegelaten tot **30/11/2025**.

(3) Dit middel zal niet meer toegelaten zijn vanaf 16/09/2025. Het op de markt brengen en het bewaren door de toelatingshouder zijn toegelaten tot 15/03/2024.
Het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn toegelaten tot 15/09/2024 en het gebruik is toegelaten tot **15/09/2025**.

(4) Dit middel zal niet meer toegelaten zijn vanaf 01/01/2026. Het op de markt brengen en het bewaren door de toelatingshouder zijn toegelaten tot 30/06/2024.
Het op de markt brengen en het bewaren door derden zijn toegelaten tot 31/12/2024 en het gebruik is toegelaten tot **31/12/2025.**

GHS02:

ontvlambaar

GHS05:

corrosief (bijtend)

GHS07:

irriterend, schadelijk

GHS08:

lange termijn gevaarlijk

GHS09:

milieuschadelijk