

IRBAB-KBIVB								
LIJST VAN DE BESCHIKBARE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN DE INDUSTRIELE CICHOREITEELT								
Meer info in publicaties van het KBIVB en op www.fytoweb.fgov.be								
Dit zijn niet noodzakelijk de aanbevelingen van het KBIVB-IRBAB, het KBIVB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan de teelt of voor een gebrek aan werking.								
FUNGICIDEN							Update : juni 2025	
Werkzame stof(fen)	Formulering	Handelsnaam	Erkenningsnummer	Dosis (l/h of kg/ha)	Max aantal toepassingen/jaar	Bufferzone (m)	Veiligheids-termijn(j)	Opmerking
azoxystrobine 250g/l	SC	AZOXYNOVA 250	36016P/B	1	1	5	21	-
		ORTIVA	9326P/B					
		ZAKEO 250 SC	10716P/B					
difenoconazool 250g/l	EC	BONECO	36443P/B	0,5	1	1	30	-
		DIFCO	32778P/P					
		DIFCOR 250 EC	9454P/B					
		DIFELCOZOR 250	34340P/P					
		GEYSER	8256P/B					
		INTER DIFENOCONAZOLE 250	32530P/P					
		MAVITA 250 EC	10715P/B					
		PROFI DIFENO 250 EC	11135P/B					
		SQUARE 250 EC	10785P/B					
		TAPIER	9477P/B					
		TAPIER 250 EC	10496P/B	0,5	1	10	30	Toepassingsstadium: ≥ BBCH 41 (begin wortel- of knolontwikkeling (diameter > 0,5 cm))
azoxystrobine 200g/l + difenoconazool 125g/l	SC	ORTIVA TOP	9556P/B	1	1	1	30	Preventief of bij het verschijnen van de eerste aantasting
fluopyram 125g/l + prothioconazool 125g/l	SE	INTER BLAST	32535P/P	1,2	2	5	7	Preventieve werking tegen echte meeldauw, alternaria en roest. Met een interval van ten minste 21 dagen tussen twee behandelingen. "Toepassingsstadium: begin wortelontwikkeling (diameter > 0,5 cm) - wortel heeft variëteitspecifieke diameter bereikt (BBCH 41-49)
		PROPULSE	10245P/B					
		PROPYRAM 250 SE	24740P/P					
		YEARLING	11190P/B					
tetraconazool 125g/l	ME	BELROSE	9897P/B	0,8	1	1	30	Het gebruik van Belrose is toegelaten tot 30/09/2026
		EMINENT	9566P/B	0,8	1	1	30	-
		GALILEO	28232P/B					
		RIVIOR	11156P/B	0,8	1	1	30	Het gebruik van Rivior is toegelaten tot 30/09/2026
		TETRACONAZOL 125	36489P/P	0,8	1	1	30	-