

IRBAB-KBIVB

LISTE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES DISPONIBLES DANS LA CULTURE DE LA BETTERAVEPlus d'infos dans les publications de l'IRBAB et sûr www.fytoweb.fgov.be

KBIVB ne peut être tenu responsable des dommages causés à la culture ou de l'inefficacité d'un produit

INSECTICIDES				Mise à jours : avril 2026					
Matière(s) active(s)	Formulation	NOM COMMUN	Numéro d'identification	Dose	Nombre de passages	Zone tampon	Rangs de sécurité	Symbole(s) de danger	Remarques
Lambda-cyhalothrine 100 g/l	CS	AKAPULKO 100 CS	1237P/P	Mouche de la betterave: 0,0625 l/ha Atomaire: 0,125 l/ha Altises: 0,0625 l/ha Chenilles défoliatrices: 0,075 l/ha	3	20	7	GHS07 GHS09	Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique. Egalement autorisé dans la culture des betteraves fourragères.
		KARATE ZEON	9231P/B, 1067P/P		3	20	7	GHS07 GHS09	
		KENDO	29009P/B		3	20	7	GHS07 GHS09	
		KUSTI	29010P/B		3	20	7	GHS07 GHS09	
		NINJA	9571P/B		3	20	7	GHS07 GHS09	
Lambda-cyhalothrine 50 g/l	EC	LAMBDA 50 EC	9749P/B	Mouche de la betterave: 0,125 l/ha Atomaire: 0,250 l/ha Altises: 0,125 l/ha Chenilles défoliatrices: 0,150 l/ha	3	20	7	GHS02 GHS07 GHS08 GHS09	Ce produit ne sera plus autorisé à partir du 30/05/2026. Pas autorisé dans la culture des betteraves fourragères.
		MARKATE 50 EC	10888P/B		3	20	7	GHS05 GHS06 GHS08 GHS09	Zone tampon de 20 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique.
		RAVANE 50	9647P/B		3	20	7	GHS05 GHS06 GHS08 GHS09	Pas autorisé dans la culture des betteraves fourragères.
Tau-fluvalinate 240 g/l	EW	EVURE	10728P/B	Pucerons: 0,25 l/ha	2	10	14	GHS09	Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de minimum 75%. Pas autorisé dans la culture des betteraves fourragères.
		FLUVELCO 240	30901P/P		2	10	14	GHS09	
		MAVRIK	7535P/B		2	10	14	GHS09	
Gamma-cyhalothrine 60 g/l	CS	NEXIDE	10110P/B	Mouche de la betterave: 0,063 l/ha	2	20	-	GHS07 GHS08 GHS09	Ce produit ne sera plus autorisé à partir du 01/10/2026. Pas autorisé dans la culture des betteraves fourragères.
Deltaméthrine 25 g/l	EC	DELTA-GLOB 25 EC	11237P/B	Pucerons: 0,3 l/ha Mouche de la betterave: 0,3 l/ha Chenilles défoliatrices: 0,3 l/ha	2	10	30	GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09	Zone tampon de 10 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique. Pas autorisé dans la culture des betteraves fourragères.
		DELTAPHAR	10354P/B		2	5	30	GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09	
		DEMETRINA 25 EC	10943P/B		2	5	30	GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09	
		MEZENE	10367P/B		2	5	30	GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09	
		POLUX	32052P/B		2	10	30	GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09	
		SCATTO	30220P/B		2	5	30	GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09	
		SPLENDOR	10466P/B		2	5	30	GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09	
Deltaméthrine 15 g/l	EW	SPLIT	10718P/B	Pucerons: 0,5 l/ha Chenilles défoliatrices: 0,5 l/ha	1	5	30	GHS02 GHS09	BBCH 11-39. Zone tampon de 5 m par rapport aux eaux de surface avec technique classique. Egalement autorisé dans la culture des betteraves fourragères.
		PATRIOT PROTECH	10717P/B	Mouche de la betterave: 0,5 l/ha	1	5	30	GHS02 GHS09	
		DECIS 15 EW	10646P/B	Mouche de la betterave: 0,5 l/ha Trips: 0,5 l/ha	1	5	30	GHS02 GHS09	
Pirimicarb 50%	WG	PIRIMOR	6640P/B	Pucerons: 0,35 kg/ha	2	1	7	GHS06 GHS08 GHS09	Egalement autorisé dans la culture des betteraves fourragères.
Flonicamide 50%	WG	AFINTO	11146P/B	Pucerons: 0,14 kg/ha	1	1	60	GHS07	À partir de BBCH 12. Egalement autorisé dans la culture des betteraves fourragères.
		ALAKAZAM 500 WG	29564P/B		1	1	60	GHS07	
		FLONICASTAR	28847P/P		1	1	60	GHS07	
		FLONIGOLD 500	32675P/P		1	1	60	GHS07	
		FLONIKI	36127P/B		1	1	60	GHS07	
		HINODE	10955P/B		1	1	60	GHS07	
		TEPPEKI	9526P/B, 29297P/P		1	1	60	GHS07	

		VELMERI 500 WG	34100P/B		1	1	60	GHS07	
Téfluthrine 1,5%	GR	FORCE 1,5 GR	10911P/B	-	1x/36 mois	20	-	GHS07 GHS09	Egalement autorisé dans la culture des betteraves fourragères.
Acétamipride 120 g/l	SL	GAZELLE 120 SL	28357P/B	Pucerons: 0,4 l/ha	1	1	28	GHS05 GHS07 GHS08 GHS09	1 application/24 mois (BBCH 12-19), 1 application/culture (BBCH 31-49). Zone tampon minimale de 1 m par rapport aux eaux de surface avec technique réduisant la dérive de minimum 90%. Pas autorisé dans la culture des betteraves fourragères.
Flupyradifurone 200 g/l	SL	FLUPYSTAR 200	36514P/P	Pucerons: 0,25 l/ha	1	1	n/a	GHS07 GHS08 GHS09	BBCH 12-19. Max. 0,25 kg flupyradifurone / 12 mois. Egalement autorisé dans la culture des betteraves fourragères.
		RIAMBA	11176P/B		1	1	n/a	GHS07 GHS08 GHS09	
		RIVALI PRIME	38615P/P		1	1	n/a	GHS07 GHS08 GHS09	
		SIVANTO PRIME	10855P/B		1	1	n/a	GHS07 GHS08 GHS09	
		VSM PRIME	1387P/P		1	1	n/a	GHS07 GHS08 GHS09	
ATTENTION! : Autorisation de 120 jours pour le Durilon valable du 01/04/2026 au 29/07/2026.									
Dimpropridaz 220 g/l	SC	DURILON	40392P/B/120	Pucerons: 0,2 l/ha	2	1	60	n/a	Intervalle d'au moins 7 jours entre 2 applications. Pas autorisé dans la culture des betteraves fourragères.
SGH02 : inflammable, SGH05 : corrosif, SGH06 : toxicité sévère, SGH07 : toxicité aiguë, SGH08 : nocif pour la santé à long terme, SGH09 : dangereux pour l'environnement.									