

LIJST VAN DE BESCHIKBARE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN DE BIETENTEELT

Meer info in publicaties van het KBIVB en op www.fytoweb.fgov.be

Dit zijn niet noodzakelijk de aanbevelingen van het KBIVB-IRBAB, het KBIVB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan de teelt of voor een gebrek aan werking.

FUNGICIDEN								Erkend tegen				Ook erkend in voederbieten?	Update: mei 2026
Werkzame stof(fen)	Formulering	Handelsnaam	Erkenningsnummer	Dosis (l/ha of kg/ha)	Max aantal toepassingen/jaar	Bufferzone (m)	Veiligheids-termijn (d)	Cercospora	Ramularia	Roest	Witziekte		Opmerking
difenoconazool 250 g/l	EC	BONECO	36443P/B	0,5	3	1	21		X	X	X	X	
		DIFCOR 250 EC	9454P/B										
		DIFCO	32778P/P										
		DIFELCOZOR 250	34340P/P										
		GEYSER	8256P/B										
		INTER DIFENOCONAZOLE 250	32530P/P										
		MAVITA 250 EC	10715P/B										
		PROFI DIFENO 250 EC	11135P/B										
		SQUARE 250 EC	10785P/B										
		TAPIER	9477P/B										
		TAPIOND	40082P/B										
		VERTIARO	40083P/B										
		DIFURE SOLO	11050P/B	0,5	2	5	21			X		Met een interval van ten minste 14 dagen tussen 2 behandelingen. Toepassingsstadium: ≥ BBCH 39 (sluiten van rijen: ongeveer 90% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar)	
		TAPIER 250 EC	10496P/B	0,5	3	10	21		X	X	X	X	Met een interval van ten minste 14 dagen tussen 2 behandelingen. Toepassingsstadium: ≥ BBCH 31 (begin sluiten rijen: 10% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar)
difenoconazool 500 g/l	SC	CURRANDO	28432P/B	0,25	2	20	21		X	X	X	X	Met een interval van ten minste 14 dagen tussen 2 behandelingen. Toepassingsstadium: 20% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bietenwortel heeft oogsgrootte bereikt (BBCH 32-49)
difenoconazool 125 g/l + azoxystrobin 125 g/l	SC	ANGLE	11138P/B	1	2	5	35	X	X	X	X	X	Met een interval van ten minste 21 dagen tussen 2 behandelingen. Toepassingsstadium : Voor zwartrot (1 toepassing) : begin sluiten rijen: 10% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - sluiten van rijen: ongeveer 90% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar (BBCH 31-39) Voor cercospora, ramularia, echte meeldauw en roest (1 tot 2 toepassingen) : sluiten van rijen: ongeveer 90% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bietenwortel heeft oogsgrootte bereikt (BBCH 39-49)
		BICANTA	10894P/B										
		QUADRIS GOLD	10900P/B										

difenoconazool 100 g/l + fenpropidin 375 g/l	EC	SPYRALE	8860P/B 1401P/P	1	1	20	28	X	X	X	X	X	Met 90% driftreducerende techniek.
difenoconazool 125 g/l + prothioconazool 175 g/l	EC	MAGANIC	32996P/B	0,8	1	10	40	X		X			Toepassingsstadium: begin sluiten rijen: 10% van de planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bietenwortel heeft oogstgrootte bereikt (BBCH 31-49)
mefentrifluconazool 75 g/l	SC	BELANTY	11216P/B	1,5	2	1	28	X	X	X	X		Met een interval van ten minste 14 dagen tussen 2 behandelingen. Toepassingsstadium: sluiten van rijen: ongeveer 90% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bietenwortel heeft oogstgrootte bereikt (BBCH 39-49)
		DYNERGY	11217P/B										
		MEFENTRIFELCO	29548P/P 33657P/P										
		VELARY	11218P/B										
prothioconazool 400 g/l	SC	CORTINA	33317P/B	0,4	2	1	28	X		X	X		Met een interval van ten minste 14 dagen tussen 2 behandelingen Toepassingsstadium: sluiten van rijen: ongeveer 90% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bietenwortel heeft oogstgrootte bereikt (BBCH 39-49)
fluxapyroxad 50 g/l + mefentrifluconazool 100 g/l	EC	REVYSTAR GOLD	11085P/B	1	2	1	28	X	X	X	X	X	Met een interval van ten minste 14 dagen tussen 2 behandelingen. Toepassingsstadium: sluiten van rijen: ongeveer 90% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bietenwortel heeft oogstgrootte bereikt (BBCH 39-49).
		VERYDOR	11101P/B										
tetraconazool 125 g/l	ME	BELROSE	9897P/B	0,8	2	1	42			X	X	X	Met een interval van ten minste 20 dagen tussen 2 behandelingen Het gebruik van Belrose en Rivior is toegelaten tot 30/09/2026.
		EMINENT	9566P/B										
		RIVIOR	11156P/B										
		GALILEO	28232P/B										
		TETRACONAZOL 125	36489P/P										
metconazool 90 g/l + prothioconazool 250 g/l	EC	PANORAMA	31120P/B	0,6	1	1	28	X		X		X	Toepassingsstadium: sluiten van rijen: ongeveer 90% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bietenwortel heeft oogstgrootte bereikt (BBCH 39-49)
		SLIPSTREAM	35951P/B										
		SUPERPOLE	34593P/B										
difenoconazool 100 g/l + metconazool 54 g/l	EC	TELESCOPE	32601P/B	1	2	20	28			X		X	Met minimum 90% driftreducerende techniek. Met een interval van ten minste 21 dagen tussen 2 behandelingen. Toepassingsstadium: sluiten van rijen: ongeveer 90% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bietenwortel heeft oogstgrootte bereikt (BBCH 39-49).
fluopyram 125 g/l + prothioconazool 125 g/l	SE	PROPULSE	10245P/B	1,2	2	5	7	X	X	X	X		Toepassingsstadium: begin sluiten rijen: 10% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bietenwortel heeft oogstgrootte bereikt (BBCH 31-49). Met een interval van ten minste 21 dag(en) tussen twee toepassingen.
		PROPYRAM 250 SE	24740P/P										
		ELDORADO	41196P/B										
		INTER BLAST	32535P/P										
		YEARLING	11190P/B										
		PUSKAS	36942P/B	1,2	2	10	21			X			Ook erkend ter bestrijding van Stemphylium. Max 0,50 kg fluopyram/ha/12 maanden.
		PROPYRANISTER	41760P/P										

zwavel 80%	WG	KUMULUS WG	9185P/B	7,5	4	1	-				X	X	Preventieve behandeling tegen witziekte, met een interval van 7-14 dagen tussen 2 behandelingen.
		HERMOVIT	6676P/B	7,5	4	1	-				X	X	Preventieve behandeling tegen witziekte
		MICROTHIOL SPECIAL WG	8775P/B										
		THIOVIT GOLD	36520P/B										
		POL-SULPHUR 80 WG	10672P/B	7,5	3	1	14				X		Preventieve behandeling tegen witziekte, met een interval van ten minste 10 dagen tussen 2 behandelingen
THIOVIT JET	5700P/B	7,5	2	1	-				X	X	Preventieve behandeling tegen witziekte, met een interval van 14-21 dagen tussen 2 behandelingen.		
zwavel 80%	WP	POL-SULPHUR 80 WP	10671P/B	7,5	3	1	14				X		Preventieve behandeling tegen witziekte. Met een interval van ten minste 10 dagen tussen 2 behandelingen
zwavel 825 g/l	SC	MICROTHIOL SPECIAL LIQUID	10929P/B	7,3	2	5	3				X	X	Preventieve behandeling. Toepassingsstadium: sluiten van rijen: ongeveer 90% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bietenwortel heeft oogstgrootte bereikt (BBCH 39-49).
zwavel 800 g/l	SC	FLOSUL	11022P/B	7,5	2	1	3				X	X	Met een interval van ten minste 15 dagen tussen 2 behandelingen.
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> strain QST 713 13,96 g/l	SC	SERENADE ASO	10299P/B	4	4	1	-	X					Toepassingsstadium: begin sluiten rijen: 10% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bietenwortel heeft oogstgrootte bereikt (BBCH 31-49) Met een interval van 5 dagen tussen 2 behandelingen