

LISTE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES UTILISES EN CULTURE DE CHICOREE A INULINE

Plus d'infos dans les publications de l'IRBAB et sur www.phytoweb.fgov.be

Ceux-ci ne sont pas nécessairement les recommandations de la KBIVB-IRBAB, l'IRBAB ne peut être tenu responsable des dommages à la culture ou à un manque d'action.

FONGICIDES								Agréé contre			Mise à jour: mai 2026
Substance(s) active(s)	Formulation	Nom commercial	Numéro d'agréation	Dose (l/h ou kg/ha)	Nbr application max/an	ZT (m)	DAR (j)	alternariose	rouille	oidium	Remarques
azoxystrobine 250 g/l	SC	AZOXYNOVA 250	36016P/B	1	1	5	21	X	X		-
		ORTIVA	9326P/B								
		ZAKEO 250 SC	10716P/B								
difénoconazole 250 g/l	EC	BONECO	36443P/B	0,5	1	1	30	X	X	X	-
		DIFCO	32778P/P								
		DIFCOR 250 EC	9454P/B								
		DIFELCOZOR 250	34340P/P								
		GEYSER	8256P/B								
		INTER DIFENOCONAZOLE 250	32530P/P								
		MAVITA 250 EC	10715P/B								
		PROFI DIFENO 250 EC	11135P/B								
		SQUARE 250 EC	10785P/B								
		TAPIER	9477P/B								
		TAPIOND	40082P/B								
		VERTIARO	40083P/B								
		TAPIER 250 EC	10496P/B	0,5	1	10	30	X	X	X	Stade d'application : ≥ BBCH 41 (racines ou tubercules commencent à se développer (diamètre > 0.5 cm))
azoxystrobine 200 g/l + difénoconazole 125 g/l	SC	ORTIVA TOP	9556P/B	1	1	1	30	X	X	X	Préventivement ou aux premiers signes d'infestation
fluopyrame 125 g/l + prothioconazole 125 g/l	SE	ELDORADO	41196P/B	1,2	2	5	7	X	X	X	Traitement préventive contre l'oidium, l'alternaria et la rouille. Avec un intervalle d'au moins 21 jours entre 2 traitements. Stade d'application : racines ou tubercules commencent à se développer (diamètre > 0,5 cm) - la racine a atteint le diamètre spécifique à la variété (BBCH 41-49) Max 0,50 kg fluopyram/ha/12 mois
		INTER BLAST	32535P/P								
		PROPULSE	10245P/B								
		PROPYRAM 250 SE	24740P/P								
		YEARLING	11190P/B								
tétraconazole 125 g/l	ME	BELROSE	9897P/B	0,8	1	1	30		X	X	L'utilisation de Belrose est autorisée jusqu'au 30/09/2026
		EMINENT	9566P/B	0,8	1	1	30				-
		GALILEO	28232P/B								
		TETRACONAZOL 125	36489P/P								
		RIVIOR	11156P/B								0,8
soufre 800 g/kg	WG	HERMOVIT	6676P/B	7,5	2	1	-			X	Traitement préventive contre l'oidium. Avec un intervalle d'au moins 14 jours entre 2 traitements. Stade d'application: la racine commence à se développer (diamètre > 0,5 cm) (≥ BBCH 41)
		MICROTHIOL SPECIAL WG	8775P/B								
		THIOVIT GOLD	36520P/B								
		THIOVIT JET	5700P/B								