KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT TOT VERBETERING VAN DE BIET VZW
Molenstraat 45, B-3300 Tienen—info@kbivb.be—www.irbab-kbivb.be

De suikerbiet en haar teelttechniek

PVBC - PROGRAMMA VOORLICHTING BIET & CICHOREI, IN HET KADER VAN DE PRAKTIJKCENTRA.


Bladziektenevolutie in 2026 volgens gegevens van onze waarschuwingsdienst

Voorkomen van bladziekten in 2026

Zoals de afgelopen jaren was Cercospora opnieuw de ziekte die domineerde. De observaties startten in 2026 al vanaf de laatste week van juni. Toen werden de eerste symptomen Cercospora waargenomen in enkele waarnemingspercelen van het KBIVB.
De eerste vlekken werden zowel gevonden op gevoelige als minder gevoelige rassen. De grafiek hieronder toont het verloop van het overschrijden van de ziektedrempels in 2026, voor een van de vier ziekten (Cercospora, witziekte, roest of Ramularia). De legende staat rechts en geeft voor de afgelopen 4 jaar weer wanneer de eerste drempel (T1) bereikt is, de tweede (T2), enzoverder.

In 2026 kwam Cercospora vroeg aanzetten door de ideale omstandigheden (warm weer en vochtige omstandigheden) en veel inoculum (startmateriaal) dat aanwezig was van de voorbije jaren. Juni was nog een natte maand, daarna kwamen juli en augustus die veel droger waren.

Cercospora overheerste en we zagen in het eerste deel van het seizoen een snelle stijging van het aantal percelen waar Cercospora gevonden werd. In de tweede week van juli (8/07) werd al op de helft van de percelen de eerste vlekken waargenomen. Merk op we een nultolerantie in 2026 en 2025 (rode en blauwe curve) hanteren, dit wil zeggen dat wanneer er Cercospora wordt opgemerkt de drempel automatisch overschreden wordt. (Dit was nog 5% drempel in 2024 en 2023.) We zien dat de curve sneller afzwakt dan in 2025 en 2024. Een verklaring kan zijn dat vanaf 1 juli een zeer droge periode aanbrak die liep tot 15 augustus. In Ukkel viel er deze zomer 200,0 mm (normaal 234,2 mm), maar werd wel gekenmerkt door de zeer droge periode van 1






juli tem 15 augustus waar er slechts 13 mm viel. Uiteraard zijn hier regionale verschillen.

Begin augustus was ondertussen al 90% van de waarnemingspercelen aan de eerste drempel en 27% aan de tweede drempel. De tweede drempel (5% Cercospora) werd vaak maar nipt overschreden op dit moment. De ontwikkeling remt af, maar Cercospora is wel alom tegenwoordig. 70% van de percelen die we opvolgen was toen al voor een eerste keer behandeld geweest.


Naast Cercospora, werden de andere typische bladziekten, roest, witziekte en Ramularia, ook waargenomen, weliswaar in mindere mate. Roest kwam voor vanaf begin juli maar werd vooral meer opvallend naar het einde van augustus toe. In dezelfde trend werd witziekte waargenomen vanaf midden juli, maar ontwikkelde echt pas later. Ramularia trad slechts op enkele locaties op met een kleine toename naar het einde van het seizoen toe.

Fungicidetoepassingen in functie van de ziektedruk én het weer


Dit jaar werden fungicidebehandelingen door de trage evolutie van Cercospora en de droogte dikwijls uitgesteld aangezien het gewas niet meer in staat was het middel efficiënt op te nemen. Daarom werd er aangeraden wanneer nodig pas opnieuw te behandelen nadat de bieten weer fris loof ontwikkelden.
De mediaan van de eerste behandelingsdatum op onze waarnemingspercelen lag op 20 juli 2026 waar gevoeligere rassen voor Cercospora gezaaid waren en lag op 25 juli 2026 voor de meer tolerantere rassen. We zagen wel dat de allereerste velden behandeld werden vanaf begin juli en dit ongeacht het ras. De eerste symptomen verschenen dikwijls gelijktijdig op zowel tolerantere als minder tolerantere rassen zodat de behandeling bij beiden gelijktijdig viel. Daarom moeten tolerantere rassen zeker even goed in de gaten gehouden worden op het voorkomen van ziekten. Hun meerwaarde is vooral merkbaar later op het seizoen.
Ook al lag de behandelingsdatum zeer vroeg in 2026, in 2025 lag de mediaan nog vroeger, namelijk op 15 juli.
Dit seizoen werden er maximaal 3 behandelingen uitgevoerd. Meer dan 90% van de velden kregen een eerste behandeling, 60% een tweede en iets meer dan 6% een derde bespuiting
De figuren hieronder geven de voorlopige resultaten (110 velden) weer van de bevraging over toegepaste fungiciden voor behandeling 1 (T1), behandeling 2 (T2) en behandeling 3 (T3) in 2026. 80% van de eerste behandelingen werd uitgevoerd met een product op basis van 'prothioconazole'. Als afwisseling werd bij de tweede behandeling voornamelijk Spyrale (difenoconcazool en fenpropidin) toegepast. De laatste figuur geeft dat in geval van een derde behandeling (T3) vaak weer een product op basis van prothioconazole werd gebruikt.



Fungicidemiddelen T1



Fungicidemiddelen T2



Fungicidemiddelen T3